

Số: 72 / TB - TT

Uông Bí, ngày 02 tháng 5 năm 2019

## THÔNG BÁO

### Phòng trừ Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn hại lúa xuân 2019

Theo kết quả điều tra sâu bệnh, hại của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp tại các phường xã trên địa bàn thành phố Uông Bí, hiện nay trên các trà lúa xuân đang giai đoạn trổ - chín sấp, có diễn biến tình hình sâu, bệnh như sau:

#### I. DIỄN BIẾN SÂU, BỆNH HẠI:

##### 1. Rầy nâu - rầy lưng trắng

Hiện nay rầy lúa 3 đang gây hại với mật độ PB: 300-500 con/m<sup>2</sup>; cao: 100 - 1500 con/m<sup>2</sup>; cục bộ: >3000 con/m<sup>2</sup> (T1 - T3) tại Nam Khê, Phương Đông, Điền Công... Trên những diện tích lúa giai đoạn trổ bông - chắc xanh - chín (đây là giai đoạn cây lúa mẫn cảm với rầy), nếu không chỉ đạo phòng trừ kịp thời sẽ gây cháy rầy cục bộ làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lúa trên địa bàn thành phố.

##### 2. Bệnh khô vằn

Bệnh phát sinh, phát triển gây hại với tỷ lệ hại phổ biến: 5 - 6 %; cao: 15% số danh bị hại (Cấp 3 - 5); Đặc biệt những ruộng lúa xanh tốt bón nhiều đạm tỷ lệ hại lên tới: 30% (Cấp 7 - 9).

#### II. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

##### 1. Rầy nâu - rầy lưng trắng

- Đối với những diện tích lúa giai đoạn sau trổ - chín dùng thuốc trừ rầy như **Bassa 50EC, Wavotox 585 EC, Anvado 100 WP...** Khi phun thuốc phải rẽ lúa thành luống nhỏ từ 80-120 cm, đưa vòi phun xuống sát gốc lúa.

- Những nơi có mật độ rầy cao >3.000 con/m<sup>2</sup> cần tiến hành phun kép 2 lần (lần 1 cách lần 2 từ 3-4 ngày).

##### 2. Bệnh khô vằn:

- Ngừng bón đạm và không phun thuốc kích thích trên các ruộng lúa bị bệnh.

- Những ruộng lúa có tỷ lệ bệnh hại từ 10% trở lên tiến hành phun phòng trừ bằng các loại thuốc như: **Tepro Super 300 EC, Tilt super 300 EC, Anvil 5SC...**

\* Chú ý:

- Khi sử dụng thuốc đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì và đảm bảo nguyên tắc “4 đúng”.

- Nếu gặp trời mưa phải tiến hành phun lại.

- Ruộng lúa bị sâu, bệnh hại nặng tiến hành phun nhắc lại lần 2 sau lần 1 từ 3- 4 ngày.

- Phun thuốc vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát.

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố Uông Bí đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo khuyến nông viên, cán bộ phụ trách nông lâm, các thôn, khu tuyên truyền hướng dẫn người nông dân phòng trừ rầy nâu-rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến một số sâu bệnh khác như sâu đục thân 2 chấm, bệnh đạo ôn cổ bông... để có biện pháp phòng trừ kịp thời đạt hiệu quả cao nhất./.

**Nơi nhận:**

- UBND thành phố Uông Bí (báo cáo);
- Chi cục trồng trọt & BVTV (báo cáo);
- Phòng kinh tế (phối hợp);
- UBND các phường xã (phối hợp);
- Trung tâm truyền thông & văn hóa (phối hợp);
- Lưu Trung tâm.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Duy Toàn**