

Số: 61/TB-TTĐVKTNN

Uông Bí, ngày 14 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
Tiếp tục phòng trừ sâu, bệnh hại trên lúa vụ xuân 2023

Theo kết quả điều tra của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố Uông Bí, tại các phường, xã hiện nay cây lúa Xuân đang giai đoạn Đẻ nhánh rộ - đứng cái – làm đòng. Thời tiết nắng nóng xen kẽ có mưa rào thuận lợi cho sâu, bệnh phát sinh phát triển mạnh gây hại trên các trà lúa Xuân cụ thể như sau:

I. DIỄN BIẾN SÂU BỆNH HẠI:

1. Sâu cuốn lá nhỏ:

Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 (Cao điểm 2) vũ hoá rộ từ ngày 10-12/4/2023 mật độ phổ biến 3 - 5 con/m², cao 10 con/m², những ruộng xanh tốt ven làng, ruộng bón nhiều đạm mật độ lên tới 25 con/m² (tại các phường, xã như: Phương Đông, Phương Nam, Yên Thanh, Trung Vương, Thượng Yên Công...); dự kiến sâu non nở rộ từ ngày 17/4/2023 mật độ phổ biến: 10 – 15 con/m², cao: 30 con/m², những ruộng xanh tốt ven làng mật độ lên tới 50 con/m², sâu non gây hại trên trà lúa xuân gây hại trực tiếp đến trà lúa đang giai đoạn đứng cái- làm đòng làm ảnh hưởng đến năng suất lúa nếu không được phòng trừ kịp thời.

2. Bệnh đạo ôn

Trên lá bệnh có tỷ lệ hại phổ biến: 2%; cao 5%; (Cb:25% đối với những giống lúa nhiễm như Nếp, BC15 không kháng đạo ôn, TBR 225, một số giống lúa lai,..., diện hẹp).

3. Bệnh khô vằn

Bệnh khô vằn tỷ lệ hại phổ biến: 3%; cao: 10%; (Cấp 3 – 5); cục bộ trên 30% (Cấp 7) tại một số điểm bón phân không cân đối, nhiều đạm bệnh nặng gây hiện tượng thối gốc, thối thân và thối lá.

II. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

1. Biện pháp phòng trừ đối với sâu cuốn lá nhỏ:

- Khuyến cáo sử dụng một số loại thuốc sau để phun trừ: **Virtako 40WG, Dasuke 250 EC Sacophos New, Pedan 50EC, Angun 5WG...**

- Những nơi có mật độ sâu cao nhất phải tiến hành phun kép 2 lần (lần 2 cách lần 1 từ 3 - 4 ngày).

+ Thời gian phun phòng trừ từ ngày: **17/4/2022 - 24/4/2023**.

2. Biện pháp phòng trừ đối với bệnh đạo ôn

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các ổ bệnh đạo ôn lá đặc biệt trên những giống nhiễm bệnh (Nếp, BC15 không kháng đạo ôn, Xi 23...).

- Trên những diện tích đã nhiễm bệnh đạo ôn phải ngừng bón đạm, phân NPK, các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá.

- Khi ruộng bị bệnh đạo ôn lá có tỷ lệ hại 5-10% số lá cần phun phòng trừ bằng một trong các loại thuốc như: **Amistar Top 325sc, Filia 525SE, Feliso 360EC, Difusan 40 EC...**

3. Bệnh khô vằn:

- Ngừng bón đạm và không phun thuốc kích thích trên các ruộng lúa bị bệnh.

- Những ruộng lúa có tỷ lệ bệnh hại từ 10% trở lên tiến hành phun phòng trừ bằng các loại thuốc như: **Tilt super 300 EC, Anvil 5SC...**

* Chú ý:

- *Khi sử dụng thuốc đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì và đảm bảo nguyên tắc “4 đúng”.*

- *Nếu gặp trời mưa phải tiến hành phun lại.*

- *Ruộng lúa bị sâu, bệnh hại nặng tiến hành phun nhắc lại lần 2 sau lần 1 từ 3- 4 ngày.*

- *Phun thuốc vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát.*

Ngoài ra cần quan tâm theo dõi sâu đục thân 2 chấm, Rầy nâu - Rầy lưng trắng, ...gây hại trên các trà lúa để có biện pháp phòng trừ kịp thời./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố Uông Bí (báo cáo);
- Chi cục TT&BVTV (báo cáo);
- Phòng kinh tế (phối hợp);
- UBND các phường xã (phối hợp);
- Trung tâm truyền thông & văn hóa (phổ hợp);
- Lưu Trung tâm.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Văn Quang